

	Lægemiddelstof Præparateksempel	Noradrenerge bivirkninger ^a (fx ortostatisk hypotension)	Histaminerge bivirkninger ^a (fx sedation og vægtøgning)	Antikolinerge bivirkninger ^a (fx obstipation og konfusion)	Seksuelle bivirkninger ^b	Risiko for QT- påvirkning ^c	Hyponatriæmi ^d	Nedsat nyrefunktion ^a
SSRI	Citalopram Cipramil®	+	++	+	+++	Ja	Høj	GFR<30: Forsigtighed
	Escitalopram Cipralextm®	+	+	+	+++	Ja	Høj	GFR<30: Forsigtighed
	Fluoxetin Fluoxetin	++	+	++	+++	Mulig	Høj	Kan anvendes
	Paroxetin Paroxetin	+++	-	++	+++	Mulig	Høj	GFR<30: Forsigtighed
	Sertralin Sertralin	++	-	+	+++	Mulig	Høj	Kan anvendes
SNRI	Duloxetin Cymbalta®	+++	+	+	++	Mulig	Høj	GFR<30: Kontraindiceret
	Venlafaxin Efexor® Depot	+	-	-	+++	Ja	Høj	GFR 30-70: Forsigtighed GFR<30: Dosisreduktion på 50%
NaSSA	Mirtazapin Combar	+	++++	++		Mulig	Lav	GFR<40: Dosisreduktion kan overvejes
	Mianserin Mianserin	++	++	+		Mulig	Lav	GFR<60: Dosisreduktion kan overvejes
TCA	Amitriptylin Saroten®	+++	++++	+++	+++	Ja	Mellem	Kan anvendes
	Clomipramin Anafranil®	+++	+++	+++	+++	Ja	Mellem	GFR<60: Monitorering anbefales
	Nortriptylin Noritren®	++++	+++	++	+	Ja	Mellem	Kan anvendes

Kilder:

- [pro.medicin.dk d. 22.5.2024](https://pro.medicin.dk/d/22.5.2024)
- Taylor, D. (2018). The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry (13. udg.), s. 358-359. Wiley-Blackwell
- [Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Psykiatrisk Selskab m.fl. Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka, Version 2. 2023; 2](#)
- Psykiatrien i Region Syddanmark: <https://psykiatriensyddanmark.dk/fagpersoner/radgivning-om-psykofarmaka/artikler-om-psykofarmaka-og-kliniske-retningslinjer/antidepressiva/hyponatriaemi>