

Aktivt lægemiddelstof Præparateksempel	QTc- forlængelse	Ekstrapyramidale symptomer	Sedation	Antikolinerge bivirkninger	Vægtøgning	Nedsat nyrefunktion
Amisulprid Solian®	++	+	+	+	++	GFR 30-60: Dosisreduktion til 50% GFR<30: Dosisreduktion til 33%
Aripiprazol Abilify®	+	+	+	+	+	Kan anvendes
Brexpiprazol RXULTI®	+	+	+	+	++	GFR<60: Maksdosis 3 mg
Cariprazin Reagila	+	++	+	+	+	GFR<30: Frarådes
Clozapin Leponex®	*	+	++	++	++	GFR<30: Kontraindiceret
Haloperidol Serenase®	+	++	+	+	+	GFR<30: Lav startdosis og langsom optitrering
Lurasidon Latuda	+	++	+	+	+	GFR<50: Startdosis (18,5 mg) og maksdosis (74 mg)
Olanzapin Zyprexa®	+	+	+	+	++	GFR<60: Lav startdosis (5 mg)
Paliperidon Invega®	+	+	+	+	++	GFR 50-80: Startdosis (3 mg) og maksdosis (6 mg) GFR<50: Yderligere 50 % reduktion af start- og maksdosis GFR<10: Kontraindiceret
Quetiapin Seroquel®	+	+	++	++	++	Kan anvendes
Risperidon Risperdal®	+	++	+	+	++	GFR<60: Startdosis og efterfølgende dosering halveres
Sertindol Serdolect®	++	+	+	+	++	Kan anvendes
Ziprasidon Zeldox®	++	++	++	+	+	Kan anvendes
Zuclophenthixol Cisordinol®	*	++	++	++	++	Kan anvendes

✚ Lav forekomst ✚✚ Høj forekomst *Der er ikke fundet data for QTc-forlængelse

Kilder:

- Medicinrådet behandlingsvejledning vedr. antipsykotika til behandling af psykotiske tilstande hos voksne – version 1.0, juli 2020, kortlink.dk/28ku9 Tabel 2, side 5.
- Nedsat nyrefunktion: Produktresumé.dk 6/5/2024