

	Lægemiddelstof Præparateksempel	Let demens	Moderat og svær demens	Formulering	Nedsat nyrefunktion	Bemærkning
Kolinesterasehæmmere	Donepecil Donepecil	X	X	Tablet		EKG før opstart. EKG skal være uden tegn til sværere overlednings- forstyrrelser og svær bradykardi.
	Galantamin Galantamin	X	X	Depotkapsel	GFR < 10 ml/min Kontraindiceret	
	Rivastigmin Nimvastid® Exelon®	X	X	Kapsel Depotplaster		
Glutamat-receptor- antagonister	Memantin Ebixa®		X	Tablet Oral opløsning	GFR < 5 ml/min. Erfaring savnes GFR < 30 Vedligeholdelsesdosis 10 mg 1 gang dgl. GFR: 30-50 Vedligeholdelsesdosis 10 mg x 1 dgl., evt. stigende til 20 mg x 1 dgl.	Memantin kan kombineres med kolinesterasehæmmer ved moderat og svær demens.

Kilder:

pro.medicin.dk, 27.06.2024

[Neurologisk National Behandlingsvejledning for Demensmedicin](#), opdateret 20.02.2023

[Seponeringslisten](#), 27.06.2024

	Lægemiddelstof Præparateksempel	Potentielt alvorlige bivirkninger (1-10 %)	Ikke-alvorlige bivirkninger (1-10 %)
Kolinesterasehæmmere	Donepecil Donepecil	Aggressivitet, agitation, hallucinationer Smerter Faldtendens Muskelkramper Svimmelhed og synkope Inkontinens	Diarré, Kvalme, Hovedpine (>10 %) Abdominale gener, opkastning, nedsat appetit Træthed, abnorme drømme og søvnløshed Hudkløe, rhinitis
	Galantamin Galantamin	Bradykardi, hypertension, synkope Depression, hallucination, somnia Abdominale smerter Muskelkramper Tremor, svimmelhed	Kvalme og opkast (>10%) Diarré, dyspepsi, Kraftsløshed, træthed, nedsat appetit, vægttab Hovedpine Rhinitis
	Rivastigmin Nimvastid® Exelon®	Abdominale smerter Agitation, angst, delir, depression, spisevægring Inkontinens, urinvejsinfektion Svimmelhed, synkope	Diarré, dyspepsi, kvalme, opkastning Kraftsløshed, temperaturstigning, træthed Vægttab, nedsat appetit Hovedpine Hududslæt og hudreaktion efter plaster
Glutamat- receptor- antagonister	Memantin Ebixa®	Balanceforstyrrelser Leverpåvirkning Hypersensitivitet Svimmelhed Dyspnø Hypertension	Obstipation Hovedpine Døsighed

Behandling med demenslægemidler er symptomatisk. Lægemidlerne kan forskyde symptomudviklingen, bedre den kognitive funktion og dermed funktionsniveauet. Ca. 25% oplever bedring, 50% stabilisering og 25% har ingen effekt. Seponér lægemidlerne, hvis der ikke er effekt eller ved uacceptable bivirkninger. Ved meget svær demens (fx sengeliggende uden sprog) seponeres også. Lægemidlerne kan seponeres uden aftrapning. Ved markant forværring inden for 2-4 uger efter seponering kan behandlingen genoptages ved optitrering.