

Doseringsforslag

- Basisliste

Aktivt lægemiddelstof Præparateksempel		Dosering	Nedsat nyrefunktion
Tricykliske antidepressiva	Amitriptylin ● Saroten®	Initialt: 10 mg til nat Maks: 100-150 mg i døgndosis	Kan anvendes
	Nortriptylin Noritren®	Initialt: 10 mg x 2 dgl. Maks: 150 mg i døgndosis	Kan anvendes
Antiepileptika	Gabapentin ● Neurontin	Initialt: 300 mg x 1-3 dgl. Maks: 3,6 g på 3-4 doseringer	eGFR 30-60 ml/min: Højst 300 mg x 3 dgl. eGFR 15-30 ml/min: Højst 300 mg x 2 dgl. eGFR < 15 ml/min: Højst 300 mg dgl.
	Pregabalin ● Lyrica®	Initialt: 150 mg fordelt på 2-3 doser Maks: 600 mg fordelt på 2-3 doseringer	eGFR 30-60 ml/min: Startdosis 25 mg x 3 dgl., højst 100 mg x 3 dgl. eGFR 15-30 ml/min: Startdosis 25 mg x 2 dgl., højst 75 mg x 2 dgl. eGFR < 15 ml/min: Startdosis 25 mg dgl., højst 75 mg dgl.
SNRI	Duloxetin ● Cymbalta®	Initialt: 60 mg x 1 dgl. Maks: 120 mg x 1 dgl.	eGFR < 30 ml/min: Lav startdosis på 20-30 mg afhængig af indikation. Optitrering efter respons.
	Venlafaxin Efexor® Depot	Initialt: 37,5 mg x 1 dgl. Maks: 375 mg x 1 dgl.	eGFR 30-60 ml/min: Anvend lavest mulige dosis og overvåg patienten omhyggeligt, hvis en dosisøgning er nødvendig. eGFR < 30 ml/min: 50 % reduktion af normaldosis.

Kilder:

- Behandling af neuropatiske smerter, NBV – kortlink.dk/2b5bu
- pro.medicin.dk / produktresume.dk

LÆGEMIDLER VED NEUROGENE SMERTER

2025

Meget almindelige bivirkninger (udvalgte)

- Basisliste

Aktivt lægemiddelstof Præparateksempl		Træthed	Svimmelhed	Hovedpine	Mundtørhed	Forstoppelse	Kvalme
Tricykliske antidepressiva	Amitriptylin ● Saroten®	X	X	X	X	X	X
	Nortriptylin Noritren®	X	X	X	X	X	X
Antiepileptika	Gabapentin ● Neurontin	X	X				
	Pregabalin ● Lyrica®	X	X	X			
SNRI	Duloxetin ● Cymbalta®	X		X	X		X
	Venlafaxin Efexor® Depot	X	X	X	X	X	X